

# **ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ**

N.Δ. Γιαδίνης

Κλινική Παραγωγικών Ζώων

Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

# Ορισμός

- Ιογενής νόσος των προβάτων (σπανιότερα αίγες και βοοειδή)
- Μεταδίδεται με σκνίπες (*Culicoides*), άλλα αρθρόποδα και βέλόνες
- Πηγή τα βοοειδή, οι αίγες και τα άγρια μηρυκαστικά
- Υποχρεωτικής δήλωσης

# Κλινική Διάγνωση

- Συνήθως μόνο πρόβατα
- Πυρετός (> 40 °C). Μερικά απύρετα.
- Κατάπτωση, μείωση της όρεξης
- Ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα
- Οίδημα προσώπου (χείλη, αυτιά)
- Διάχυτη ερυθρότητα σε άψιλα μέρη
- Κυανή γλώσσα (σπάνια)
- Χωλότητες (στεφάνη, μυϊτιδες)
- Θάνατοι ανάλογα με το στέλεχος
- Αναπαραγωγικά προβλήματα (αποβολές, τερατογενέσεις, επιστροφές)

# Διάγνωση

- Λήψη δειγμάτων αίματος (ορολογικά, PCR)
- Τον επόμενο χρόνο;

# Αντιμετώπιση

- Θεραπεία δεν υπάρχει
- Αντιβιοτικά για δευτερογενείς μολύνσεις
- Πρόληψη με εντομοαπωθητικά στα ζώα και στον χώρο
- Προσοχή σε βοοειδή και αίγες
- Εμβόλια (;)

# Διαφορική διάγνωση

- Λοιμώδες έκθημα (μπούζα)
- Ευλογιά
- Φωτοδερματίτιδα
- Κλωστρηδιακές λοιμώξεις
- Νύγματα εντόμων
- Ποδοδερματίτιδες
- Ενδονυχίτιδες